

COVID-19 疫苗情況說明書

疫苗是如何工作的？

輝瑞疫苗和 Moderna 疫苗都讓您的身體製造一種在病毒中發現的無害蛋白質，並開始形成抗體，如果您接觸到真正的病毒，抗體就能與之對抗。疫苗是用針頭接種到您上臂的肌肉中，第一和第二劑使用同樣的疫苗。兩劑後，疫苗的有效率預計為 94-95%。

我能接種疫苗嗎？

如果您 **16 歲或以上**，您可以接種輝瑞疫苗，如果您 **18 歲或以上**，您可以接種 Moderna 疫苗。

如果出現以下情況，您**不該**接種 COVID-19 疫苗：

- 您曾經對接種這種疫苗有過嚴重的過敏反應(如過敏)。您可在此處查看原料清單：[Pfizer-BioNTech vaccine monograph / Moderna COVID-19 vaccine monograph](#)

您**應該推遲**接種 COVID-19 疫苗，如果：

- 在過去的 14 天裡，您接種了另一種疫苗(不是 COVID-19 疫苗)。
- 您出現疑似 COVID-19 疾病的急性症狀；您應該等到您的症狀消退，而且至少 24 小時沒有發燒。
 - 如果您住在長期護理院，被診斷為陽性而隔離，而且您的症狀正消退，您可以接種疫苗。
 - 如果您住在長期護理院，冠狀病毒檢測為陽性且無症狀，那麼在您的陽性檢測至少 72 小時以後，您可以接種疫苗。

如果出現以下情況，您**可能能夠接種 COVID-19 疫苗，但應該採取預防措施**，如接種疫苗後觀察 30 分鐘：

- 您有出血問題，容易瘀傷或使用血液稀釋藥物。
- 您有嚴重過敏反應的病史，例如對某些食物、寵物或乳膠過敏。

請參閱特殊人群指導檔：[特殊人群指導建議](#)

在我接種 COVID-19 疫苗後該怎麼辦？

- 在離開就診前至少等待 15 分鐘，如果您感到不適，立即通知醫療保健提供者。
- 您可能會感覺到一些副作用，比如：
 - 接種部位疼痛，發紅，腫脹
 - 疲勞
 - 頭疼
 - 肌肉疼痛或關節疼痛
 - 發燒，發冷
 - 腺體腫脹
 - 腹瀉
 - 噁心/嘔吐

接受疫苗後很少有嚴重副作用。然而，如果您在接種疫苗後嚴重不適，三天內出現以下任何不良反應，請立即就醫或撥打 911：

- 麻疹
- 面部或口腔腫脹
- 呼吸困難
- 臉色蒼白及嚴重嗜睡
- 高燒(超過 40°C)
- 抽搐或癲癇
- 其他嚴重症狀(如“四肢發麻”或麻木)