

Міністерство довгострокового догляду (січень 2021 р.)

Довідкова інформація про вакцину проти COVID-19

ЯК ДІЮТЬ ВАКЦИНИ?

Обидві вакцини, Pfizer-BioNTech і Moderna, передають організму людини інструкцію для створення нешкідливого білка, що міститься у вірусі, після чого починають вироблятися антитіла, які можуть боротися зі справжнім вірусом, якщо він потрапить до організму. Вакцини вводять за допомогою голки в м'яз надпліччя. Для першої й другої дози використовують однакову вакцину. Ефективність вакцин після двох доз становить приблизно 94-95%.

ЧИ МОЖНА МЕНІ ВАКЦИНУВАТИСЯ?

Вам можна робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, якщо вам виповнилося **16 років**, а вакциною Moderna — якщо вам виповнилося **18 років**.

Вам **не можна** робити щеплення проти COVID-19, якщо:

- У вас раніше була важка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на попередню дозу вакцини цього типу. Перелік складників можна переглянути тут: [монографія вакцини Pfizer-BioNTech / монографія вакцини Moderna проти COVID-19](#).

Потрібно **відкласти щеплення** проти COVID-19, якщо:

- Упродовж останніх 14 днів вам робили інше щеплення (не вакциною проти COVID-19).
- У вас наявні гострі симптоми хвороби, подібної до COVID-19. У цьому випадку слід зачекати, доки симптоми не зникнуть, а температура тіла не буде в нормі щонайменше 24 години поспіль.
 - Якщо ви живете в закладі довгострокового догляду й перебуваєте в ізоляції з підтвердженим діагнозом, але симптоми вже зникають, то вам **можна робити** щеплення.
 - Якщо ви живете в закладі довгострокового догляду й маєте позитивний результат тесту на вірус, але перебіг хвороби безсимптомний, то вам **можна робити** щеплення, якщо з моменту позитивного тесту минуло щонайменше 72 години.

Вам **можна робити щеплення проти COVID-19, але слід дотримуватися заходів безпеки**, зокрема 30 хвилин після щеплення перебувати під наглядом лікаря, якщо:

- У вас є проблеми зі згортанням крові, часто виникають гематоми або ви вживаєте лікарський препарат для розрідження крові.
- У вас раніше були серйозні алергічні реакції (наприклад, анафілаксія) на певні харчові продукти, домашніх тварин або латекс.

Ознайомтеся з рекомендаціями для особливих груп населення: [рекомендації щодо вакцинації особливих груп населення](#),

ЯК МЕНІ ПОВОДИТИСЯ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ COVID-19?

- Зачекайте щонайменше 15 хвилин, перш ніж залишити медичну установу, і негайно повідомте лікаря, якщо ви погано почуваетесь.
- Ви можете відчути деякі побічні ефекти, як-от:
 - біль у місці ін'єкції, почервоніння, набряк;
 - жар, озноб;
 - слабкість;
 - набряк мигдалин;
 - головний біль;
 - діарею;
 - біль у м'язах або суглобах;
 - нудоту або блювоту.

Серйозні побічні реакції після щеплення зустрічаються рідко. Однак у разі виникнення хоча б однієї з перелічених нижче побічних реакцій протягом трьох днів після щеплення негайно зверніться до лікаря або зателефонуйте за номером 911, якщо ви дуже погано почуваетесь:

- кропив'янка;
- набряк обличчя або рота;
- утруднене дихання;
- значна блідість і сильна сонливість;
- підвищення температури тіла (вище 40 °C);
- судоми або конвульсії;
- інші серйозні симптоми (як-от поколювання або оніміння).